

INSTRUCCIONES PARA LA COLONOSCOPIA CON CLENPIQ

1. **Medicación:** Por favor notifiquenos si usted toma los siguientes medicamentos: **Plavix, Aggrenox, Pletal (cilostazol), Coumadin (Warfarina), Pradaxa, Effient, Xarelto, Brilinta o Eliquis.** Debe dejar de tomar estos medicamentos 5 días antes de su procedimiento. por favor, consulte con su cardiólogo o PCP si es seguro que usted suspenda estos medicamentos debido a sus condiciones de salud. Usted no debe usar **Lovenox o Fragmin** el día de su procedimiento. Si toma aspirina para bebés, debe continuarla a menos que su cardiólogo o PCP le recomiende lo contrario. Si usted es diabético, por favor consulte a su médico de atención primaria con respecto a su medicación y dieta. Usted puede continuar tomando todos los demás medicamentos. **Por favor, llame a nuestra oficina con cualquier pregunta que pueda tener**

Si usted es Diabético o toma alguno de los siguientes medicamentos: **Glucagon (GLP-1), Trulicity, Bydureon BCise, Byetta, Saxenda, Victoza, Adlyxin, Ozempic, Wegovy, Mounjaro.** Debe parar el medicamento una semana antes del procedimiento. **Si consume Rybelsus** pare su medicamento el día antes del procedimiento.

2. **Dieta Líquida:** El día antes de la colonoscopia, debe estar en una dieta líquida todo el día. **LÍQUIDOS CLAROS SÓLAMENTE! ;NO COMA NADA SOLIDO!** Beba muchos líquidos durante todo el día.

Evite productos lactosos y todo lo que es Rojo, Azul o Morado!

Jugos de frutas (sin Pulpa) Jugo de Manzana, Limonada	Paletas de Agua (No Rojo, Azul o Morado)
Café o Te (Sin Crema or Leche)	Caldo de pollo or res (Solo el conzome)
Gatorade	No productos lactosos o Alcohol
Agua	
Gelatina (No Rojo, Azul o Morado)	

Instrucciones de preparación:

DÍA ANTES: Puede refrigerar ambas botellas de CLENPIQ. Usted comenzará a beber su primera dosis de CLENPIQ a las 4:00pm. Cuando termine debe beber (5) cinco tazas (40 oz.) de agua.

SEGUNDA DOSIS: A las 10:00 PM, beba la segunda dosis de la preparación. Siga con (3) tres tazas (24 oz.) de agua. Asegúrese de beber líquidos claros entre las dosis de preparación para asegurar una hidratación adecuada.

NO BEBA NADA 4 HORAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO.

Por favor, retire todas las joyas antes del procedimiento.

Transporte: Debe tener a alguien que conozca que lo lleve a casa. Taxis; Uber; Lyft o autobuses no son aceptables. Usted puede esperar estar en la instalación 2-3 horas desde el momento de su llegada.

Por favor, presentese a:

- North Central Surgical Center, 9301 N Central Expressway, Tower II, 6th floor, Suite 670, Dallas, TX 75231 (214) 365-8380
- Baylor Ambulatory Endoscopy Center, 4708 Alliance Blvd., Medical Pavilion 1, Ste 210 Plano, TX 75093 (469) 800-6021
- Baylor Scott & White Medical Center Plano, 4700 Alliance Blvd., 1st Floor, Registration Plano, TX 75093 (469) 814-5200

Fecha:

Hora de procedimiento:

Hora de registracion:

Doctor:

PARA EVITAR UNA TARIFA DE NO PRESENTACIÓN / CANCELACIÓN, LLAME A LA OFICINA 48 HORAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO AL (469) 800-6020.